

Sistematska botanika



Toni Nikolić prof. dr.

kolegij: BO4035 (2+4+0) 7 ECTS

Predavanja BO6 (Marulićev trg 20/2)
Praktikumi 8P2 (Marulićev trg 20/1)

Marulićev trg 9a/2 (Botanički vrt, veća zgrada II kat)
tel. 01/4898-064, (toni.nikolic@biol.pmf.hr)
konzultacije i upiti: ponedjeljkom 09.00 - 10.00 h
najava mailom

Asistenti

dr. sc. Ivana Rešetnik

tel. 01/4898-091 (ivana.resetnik@biol.pmf.hr)
Marulićev trg 9a/2 (Botanički vrt)

mr. sc. Danijel Škrtić

PhD student (astrobiolog@gmail.com)

Sistematska botanika

Organizacija kolegija:

Predavanja

Obavezna, bez evidencije

Terenska nastava


Na kraju smestra

Praktična nastava

Obavezna, do 2 opravdana
izostanka u semestru.
Evidencija! Turnusi!

Izrada zbirke


100 herbarskih primjeraka



Sistematska botanika

Pribor i materijal za praktičnu nastavu:

- kuta
- predmetna stakalca (20 kom. po studentu)
- pokrovna stakalca
- kutija žileta
- dvije laboratorijske iglice
- pinceta
- (kapaljka)
- krpica
- mapa (fascikl)
- A4 papiri
- pribor za pisanje i crtanje
-



Program rada i obaveze

Program:

1. Uvod, definicije
2. Povijesni prikaz
3. Nomenklatura i determinacija
4. Makroklasifikacija
5. Izmjena generacija
6. Mahovine
7. Papratnjače
- 8. Kolokvij I**
9. Golosjemenjače I
10. Kritosjemenjače I
11. Kritosjemenjače II
12. Kritosjemenjače III
- 13. Kolokvij II**
14. Kritosjemenjače IV
15. Kritosjemenjače V
16. Kritosjemenjače VI
17. Kritosjemenjače VII
- 18. Kolokvij III**

Obaveze i polaganje ispita:

- Redovito pohađanje predavanja
- Redovito pohađanje praktične nastave
- Izrađena herbarska zbirka (kolokvij zbirke)
- Pismeni kolokviji – I, II, III
- Usmeni ispit (prema rezultatima)

Pravila ponašanja: ne kasniti, uobičajena disciplina, pitati sve, nositi pribor

Održavanje kolokvija: izvan redovite satnice



Prag: 65-70%



LITERATURA

Obavezna:

1. **Nikolić, T. (2013):** Sistematska botanika - raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Alfa d.d. 2013, 1-882. Zagreb (udžbenik).
2. **Nikolić, T. (2013):** Praktikum sistematske botanike - raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Alfa d.d. 2013, 1-256, Zagreb (udžbenik).
3. **Nikolić, T. (2017):** Morfologija bilja. Razvoj, građa i uloga biljnih tkiva, organa i organskih sustava. Alfa d.d., Zagreb, 1-569 (udžbenik).




Popust 20%
uz
predočenje
indeksa

Nikolić, T. (2013): Sistematska botanika - raznolikost i evolucija biljnog svijeta.
Alfa d.d. 2013, 1-882. Zagreb (udžbenik).

- Opći djelovi: 17-28 str.
- Nomenklatura: 32-38 str.
- Klasifikacija: 39-59 str.
- Evolucija i filogenija: 59-83 str.
- Taksonomski podaci: 86-121 str. (informativno)
- Povijest: 125-148 str.

- Kopnene biljke: 159-182 str.
- Mahovine: 184-186 str.
- Polysporangiophyta: 204-213 str.
- Paprati: 234-236 str.
- Sjemenjače: 264-284, 334-347 str.



cca 160 strana ukupno

+

Porodice koje se obrađuju na praktikumu

LITERATURA

Dopunska literatura i terenska nastava:

1. Nikolić, T. (1996): Herbarijski priručnik. Zagreb: Školska knjiga d.d. (**terenska nastava**)
2. Domac R. (1994): Flora Hrvatske. Priručnik za određivanje bilja. Školska knjiga, Zagreb. (**terenska nastava**)
3. Nikolić, T. (2006): Flora. Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb. (**terenska nastava**) (<http://www.dzzp.hr/publikacije/prirucnici/bioloska-raznolikost-hrvatske-prirucnici-za-inventarizaciju-i-pracenje-stanja-536.html>).
4. Nikolić, T.; Kovačić, S. (2008): Flora Medvednice. 250 najčešćih vrsta Zagrebačke gore. Školska knjiga d.d. & Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 4-543. (**terenska nastava**)
5. Kovačić, S.; Nikolić, T. i sur. (2008): Flora jadranske obale i otoka - 250 najčešćih vrsta. Školska knjiga d.d. & Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 4-558. (**terenska nastava**)
6. Nikolić T., Mitić B., Boršić I. (2014): Flora hrvatske: invazivne biljke. Alfa d.o.o., Zagreb 6-295. (**terenska nastava**)
7. Franjić J., Škvorc Ž. (2014): Šumsko zeljasto bilje Hrvatske. Šumarski fakultet, Zagreb. (**terenska nastava**)
8. Franjić J., Škvorc Ž. (2014): Šumsko drveće i grmlje Hrvatske. Šumarski fakultet, Zagreb. (**terenska nastava**)



Internet podrška

Obavezna:

1. Sistematska botanika

<http://hirc.botanic.hr/sist-bot/sist-bot-home.htm>

2. Botanički Praktikum On-line

<http://www.botanic.hr/praktikum/home.htm>

3. Flora Croatica Database

<http://hirc.botanic.hr/fcd/>

Neobavezna i druga:

1. Bibliografija flore Hrvatske

2. Internet Directory for Botany

3. Središnja biološka knjižnica

Sve na jednom mjestu:

<http://www.botanic.hr>



DEPARTMENT OF BOTANY
Division of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb
Address: Marulićev trg 20/2, HR - 10000 Zagreb, Croatia
Phone: (+385 1) 48 98 064 Fax: (+385 1) 48 98 093
e-mail: toni@botanic.hr

SISTEMATSKA BOTANIKA / SYSTEMATIC BOTANY

kolegij BO4035 / lecture BO4035

Opće informacije o kolegiju (home)

(General info)

Program kolegija

(Programme)

Istrenjska nastava

(Field work)

Literatura

(References)

Polaganje i rezultati

(Exams & Results) NEW

Predavanja on-line

(Lectures on-line)

Botanički praktikum

(Botanical Lab)

Flora Croatica baza

podataka

(Flora Croatica Database)

Središnja biološka

knjižnica

(Central Biological Library)

Druge poveznice

(Related links)

Opće informacije o kolegiju

• Kolegij: Sistematska botanika

• Kod: BO4035

• Klasa: obavezni kolegij

• Smjer: Preddiplomski studij biologije (prvostupnik biologije)

• Godina studija: 3.

• ECTS: 7

• Vrijeme odvijanja: ljetni semestar (prema kalendaru nastave)

• Satnica: 2+4+0

• Mjesto odvijanja predavanja: BO6 (Marulićev trg 20/2)

• Mjesto odvijanja praktikuma: 8P3, BP1

• Raspored nastave: prema satnicu Biološkog odsjeka

• Voditelj kolegija: prof. dr sc. T. Nikolić

• Voditelj praktikuma: Dr. sc. I. Rešetnik

• Voditelj terenske nastave: T. Nikolić i suradnici

• Uvjeti za potpis: uredno pođadanje predavanja, najviše dva opravljena izostanka s praktikuma, provedena terenska nastava

• ISHODI UČENJA, polaznici će moći:



Botanički praktikum On Line

Botanički praktikum On Line podrška je provedbi nastave iz botanike kolegija **Kormofita** (4103, 4104) i **Botanika** (4021) na **Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu**. Sadržaj će, međutim, biti korisno nastavno pomagalo i za potrebe izvođenja nastave na srodnim fakultetima koji izučavaju botaniku u manjem obimu, npr. farmaciji, agronomiji, šumarstvu ili sl. Ovaj dio praktikuma realiziran je djelomično u okviru projekta **Ministarstva znanosti i tehnologije** (id. 00-26, ugovor 354-1-0311-2000).

Die sadržaja prilagođen je uporabi u savladavanju nastavne građe iz predmeta Biologija u srednjim školama. Ovaj dio Praktikuma realiziran je u okviru projekta **Hrvatskog prirodoslovnog društva E-skoala** mladih znanstvenika - **Biologija** uz finansijsku potporu **Otvorenog društva - Hrvatska**.

Sav materijal na ovom site-u može se na drugim lokacijama koristiti isključivo za edukativne svrhe. Ukoliko imate drugačije namjere molimo vas da nas prije kontaktirate.

Sugestije i komentari na mail: toni@botanic.hr
Materijale priredi: Alma Valent, Marin Grgurev, Iva Dobrovic

web master: [Marin](#) i [Vinko](#)

u suradnji s [CARNet](#)-om

Flora Croatica Database

<http://hirc.botanic.hr/fcd>

► Detaljni pregled 🕒

► **Pistacia lentiscus L.**

Red Sapindales Porodica Anacardiaceae

Mjesto objavljivanja Sp. Pl. 1026 (1753)

Autor(i) svojte:

1 Carl von,Carl von **Linnaeus,Linné**

Sinonimi: (Pistacia chia Desf., sinonim)

Narodna imena: [tršlja (Hr.) , Domac, R. , 19 (Hr.) , Visiani, R. , 1852 **1686**] , [smarka (Hr.) , Visiani, R. , 1852 **1686**] , [taraslaka (Hr.) , Visiani, R. , 1852 **1686**] , [marta čarna (Hr.) , Visiani, R. , 1852 **1686**] , [crnomrta (Hr.) , Šulek, B. , 187 [mastika (Hr.) , Šulek, B. , 1879 **1256**] , [mrč Šulek, B. , 1879 **1256**] , [mrvinja (Hr.) , Šulek, B. , 1879 **1256**] , [smarča (Hr.) , Šulek, B. , 1879 **1256**] , [trišlica (Hr.) , 1894 **783**] , [trišljaj krilasti (Hr.) , Schlosser smrdljika (Hr.) , Pahlow, M. , 1899 **7748**]

Status: Endem NE , Dvojbena NE , Kultivar N

► Slikovna dokumentacija




1
2
3

► Ekološki indeksi

Areal N - mediteranska (0)

► Nalazišta iz literature

| Opis nalazišta | Autori |
|---|-------------------------|
| Trtuša, otok Kornat, Kornatsko otočje (Kornati), sjeverna Dalmacija | Pandža, M.; Stančić, Z. |
| Tarac, otok Kornat, Kornatsko otočje (Kornati), sjeverna Dalmacija | Pandža, M.; Stančić, Z. |

► Opažanja

| Opis nalazišta | Autor |
|---|--------------|
| Ušće Neretve, ušće Male Neretve, mjesto Blace, u neposrednoj | Više autora, |

Dalmatia (B) C.L. Petter 3163

► Izrada karte rasprostranjenosti

Nema podataka u herbaru za ovu vrstu.

Lokacije podataka za ovu vrstu možete pogledati pomoću **FCDMapSurfera**.

► Detaljni pregled 🕒

Narodna imena: [cer (Hr.) , Domac, R. , 1994 **4**] , [hrast-cer (Hr.) , Hirc, D. , 1904 **67**] , [cerovec (Hr.) , Hirc, D. , 1904 **67**] , [grkac (Hr.) , Hirc, D. , 1904 **67**] , [cerovina (Hr.) , Visiani, R. , 1842 **5573**] , [cerič (Hr.) , Šulek, B. , 1879 **1256**] , [sladun (Hr.) , Visiani, R. , 1842 **5573**] , [Turkey oak (En)]

Status: Endem NE , Dvojbena NE , Kultivar NE , Naturalizirana NE

► Slikovna dokumentacija





1
2
3
4

► Ekološki indeksi

Svjetlost - Ellenberg (L) : 6-između **Hranjivost - Landolt** : 2-pokazatelj siromašnih tala (b. na hranivom siromašnom tlu, uglavnom ne dolaze na tlima s dobrom i jako dobrom hranivošću, nije dovoljno konkurentna)

Temperatura - Ellenberg (T) : 8-između 7 i 9 (težište na submediteranskim staništima)

Kontinentalitet - Ellenberg (K) : 4-suboceanska svojta (težište - zapadni (puno svjetlo, povremeno podnosi manju dio srednje Europe, prodire na istok) zasjenju)

Vлага - Ellenberg(F) : 4-između 3 i 5 **Temperatura - Landolt (T_L)** : 5-bilje uglavnom južne Europe (b. uglavnom rasp. na toplijim staništima)




T. Nikolić

Sist

10

BOTANIČKI PRAKTIKUM ON-LINE

Sadrži obrađen praktikumski materijal



1. Navesti glavne odlike klasifikacijskih sustava i objasniti glavne metode rada sistematske botanike
2. Povezati povijesni slijed otkrića značajnih u razvoju sistematske botanike s naglaskom na umjetne, fenetske i filogenetske koncepte
3. Razlikovati osnovna nomenklaturna rješenja u imenovanju svojtih kao i ulogu Nomenklaturnog koda u botanici
4. Opisati glavne evolucijske tokove u kopnenih biljaka
5. Razlikovati osnovne tipove i načela izmjene generacija, dati primjere, objasniti osnove građe i njihovu ulogu u evoluciji
6. Prikazati građu i glavne odlike makroskupina kopnenih biljaka (mahovine, papratnjače, golosjemenjače, kritosjemenjače) i odabralih porodica
7. Prikazati usporednu građu i evolucijske slijedove glavnih organa i organskih sustava (npr. od megasporangija do sjemenog zametka)
8. Koristiti laboratorijski pribor i tehniku u sagledavanju građe kopnenih biljaka, te on-line materijale i baze podataka
9. Baratati biljnim materijalom i ilustrirati/skicirati glavne odlike odabralih biljaka
10. Analizirati građu tipičnih predstavnika karakterističnih porodica kopnene flore




Goli čovik (*Arbutus andrachne* L.)

Zašto bi se bavili biljkama?

- osim iz radoznalosti

1. Biljke provode **fotosintetske procese** s nizom primarnih i sekundarnih produkata
2. Biljke **kisikom koje stvaraju**, omogućuju aerobni način života
3. Biljke **kisikom koje stvaraju** omogućuju nastanak ozonskog sloja i zaštitu od UV-a
4. Biljke su jedina živa bića na planeti koja mogu u jedinstvenoj kemijskoj reakciji iz anorganskih sastojaka (CO_2 i H_2O) **proizvesti organske spojeve** uz sunčevu svjetlost kao izvor energije.
5. Biljke su temelj gotovo svih **prehrambenih lanaca**
6. Biljke su uglavnom **dominantna sastavnica većine ekosustava**
7. Biljke kao dio ekosustava, utječe na nastanak tla, protok vode, klimu, pročišćavanje zraka i vode, sprječavaju eroziju i poplave, te omogućuju ispravno **kruženje mnogih elemenata** u biosferi (plinova, mikroelemenata)



K: 18 - 22



Zašto bi se bavili biljkama?

- osim iz radoznalosti

- sabire biljke za hranu
- uzgaja biljke za hranu
- uzgaja biljke kao stočnu hranu
- sabire i uzgaja biljke kao materijal
- sabire i uzgaja biljke za gorivo
- sabire i uzgaja biljke za proizvodnju ljekova
- sabire i uzgaja biljke kao dodatak hrani
- sabire i uzgaja biljke za preobrazbu okoliša
- sabire i uzgaja biljke za druge namjene

Prema podacima FAO-a, godišnja žetva žitarica u svijetu je $> 2.300.000 \times 10^3$ tona, a plodova i različitog povrća $> 1.400.000 \times 10^3$ tona.

**Iz biljaka se neposredno namiruje
65 - 95% potreba ljudi za
kalorijama, te 30 - 79 potreba za
proteinima** (ovisno o području).



SISTEMATIKA

TAKSONOMIJA

Klasifikacija

jedinke i populacije

vrste

hierarhija kategorije

Identifikacija

jedinke, kategorije, ključevi za determinaciju, monografije, ikonografije, opisi

Nomenklatura

jednoznačno imenovanje, standardizacija, nomenklaturna pravila, razvoj standarda

EVOLUCIJA

Proučavanje:

- izvori varijabilnosti
- diferencijacija populacija
- reproduktivna izolacija
- postanak i porijeklo vrsta
- hibridizacija
- biogeografija
- ...

FILOGENIJA



Proučavanje:

- divergencija
- adaptivna radijacija
- procesi
- vrijemenski slijedovi
- prostorna distribucija
- rekonstrukcije
- ...

Osobine

Kako akumuliramo podatke u sistematskoj botanici?

1. Sistematski, tj. filogenetski **informativne osobine**, poželjno poznatog evolucijskog tijeka, osnova su gradnje dendrograma, filograma i klasifikacijskog sustava općenito!
2. Svaka osobina **potencijalno** može biti informativna na nekoj klasifikacijskoj razini
3. **Izvori** informativnih osobina – vrlo brojni, dolaze iz različitih bioloških disciplina!



- Morfologija bilja
- Anatomija bilja
- Citologija
- Genetika
- Molekularna biologija
- Sistematika
- Paleobotanika
- Fitokemija
- Ekologija
- Fiziologija bilja
- Palinologija
- i dr.

K: 86 - 125

Osobine

A/ Kvalitativne:

A1- binarne, osobina koja uvijek ima samo dva diskretna stanja. Npr. osobina «filotaksija listova» u neke skupine može biti samo «izmjenična» i «nasuprotna».

A2 - nominalne neuređene, osobina koja može imati više od dva diskretna stanja. Npr. osobina «boja cvijeta» u neke skupine može biti «bijela», «crvena», «plava» i «roza».


B/ Kvantitativne:

B1 - nominalne uređene, osobina koja može imati više od dva diskretna stanja, no vrijednosti stanja su međuvisna i redoslijed je značajan. Npr. osobina «veličina x» može imati stanja «mala», «srednja», «velika» i «jako velika».

B2 - merističke, osobina koja može poprimiti cjelobrojnu vrijednost unutar nekog raspona. Npr. osobina «broj plodnih listova» određuje koliko plodnih listova gradi ginecej u cvijetu neke svojte, pa ih može npr. biti 1 (npr. *Prunus*), 2 (npr. *Salix*), 3 (npr. *Lilium*), 4 (npr. *Parnassia*), 5 (npr. *Oxalis*), 6 (npr. *Butomus*), itd.

B3 - kontinuirane, osobina koja može poprimiti bilo koju vrijednost u rasponu od 0 do ∞ (ne samo cjelobrojnu). Kontinuirane osobine su najčešće povezane uz mjerjenje nekog svojstva (npr. duljine, širine, mase, površine, volumen, trajanje, koncentracije, i sl.). Npr. osobina «duljina donje usne» nekog cvijeta može biti *bilo koja vrijednost* unutar raspona od npr. 6,00 mm do 12,5 mm. Unutar ovog raspona postoji neizmjerna broj mogućih vrijednosti, tj. stanja za ovu osobinu.


Hierarhijski sustavi



Sistematska botanika - Uvod


T. Nikolić

| Osobina | Kod | Stanja |
|---------|-----|-----------|
| | 1 | crvena |
| | 2 | s. zelena |
| | 3 | t. zelena |
| | 4 | crna |
| | 5 | s. plava |
| | 6 | t. plava |
| | 7 | oker |
| | 8 | siva |
| | 1 | krug |
| | 2 | kvadrat |
| | 3 | trokut |



Proces

Izolacija,
promjene uvjeta,
selekcija,
divergencija, ...
evolucija




Video clip:
[Web Geol](#)


K: 59 - 83

Priča

- Raflezija (*Rafflesia*, porodica *Rafflesiaceae*) je rod koji sadrži 15-ak vrsta tropa južne Kine, Butana, Tajlanda, Malajskog poluotoka, Filipina, Sumatre, Bornea i zapadne Malezije.
- Otkrivena je krajem 18. stoljeća u kišnim šumama Indonezije.
- Ove neobične biljke nemaju korijen, ni stabljiku, a ni listove.
- Obligatni endoparaziti korijena i puzajućih izdanaka drvenastih vrsta penjačica roda *Tetrastigma* (*Vitaceae*).
- Razvijaju se unutar tkiva domadara u obliku filamentoznih haustorija i u cijelosti ovise o njemu.
- Jedini dio raflezije koji se može vidjeti izvan domadara je cvijet – najveći u kritosjemenjaču! Promjer u pojedinih vrsta > 1 m i mase do 10 kg.
- Od trena pojave pupova do završetka oprasivanja i oplodnje može proći i ~ 250 dana.
- Cvjetni pup veličine glavice kupusa postupno se otvara tijekom 24 – 48 sati i ostaje otvoren 3 – 5 dana. Izgledom i bojom, osobito mirisom po trulom mesu privlači kukce oprasivače.
- U roku od šest do osam mjeseci razviju se plodovi. Rasprostiranje - mnoge šumske životinje: mravi, termiti, vjeverice, miševi, svinje, slonovi i dr. kao konzumenti koji šire sjemenke izmetom ili kao pasivni prenosnici.
- Uspješno prenesena sjemenka naći će se na korijenu ili stabljici domadara te klijanjem razviti haustorije.
- Prvo cvjetanje uslijedi nakon 3 – 4,5 godina od inokulacije.
- Horizontalni prijenos gena – HGT, prijenos između vrsta koje uopće nisu srodrne.
- Filogenetska analiza mitohondrijskih (*matR*) i jezgrinih lokusa (18S ribosomalne DNA i *PHYC*) nedvojbeno smješta porodicu *Rafflesiaceae* u red *Malpighiales*.
- Međutim mitohondrijski nad1B-C povezuje rafleziju s njezinim domadarom, rodom *Tetrastigma* (*Vitaceae*).
- Raflezija je dio svojeg genoma dobila od biljke na kojoj parazitira. Način ovog prijenosa još uvijek nije jasan.



[Video clip!](#)



Idealna klasifikacija odraz je filogenije, tj. **srodstvenih odnosa**. Idealna skupina je **monofiletska**, tj. svi članovi vode porijeklo od istog pretka!

Klasifikacija i imenovanje

Taksonomske kategorije u njihova uporaba dogovorena je Kodom botaničke nomenklature!


| TAKSONOMSKE KATEGORIJE | | ZAVRŠETCI | | TAKSONOMSKE JEDINICE |
|------------------------|-------------------|--|--|--|
| hrvatski | latinski | završeci | razlike | |
| Carstvo | <i>regnum</i> | -ota | | <i>Plantae</i> |
| Potcarstvo | <i>subregnum</i> | -bionta | | <i>Cormobionta</i> |
| Odjeljak | <i>phylum</i> | -phyta -mycota | stablašice gljive | <i>Spermatophyta</i> |
| Pododjeljak | <i>subphylum</i> | -phytina -mycotina | stablašice gljive | <i>Magnoliophytina</i> |
| Razred | <i>classis</i> | -opsida (-atae) -phyceae -mycetes | stablašice stablašice alge gljive | <i>Magnoliopsida</i> <i>(Magnoliatae)</i> |
| Podrazred | <i>subclassis</i> | -idae | | <i>Asteridae</i> |

Klasifikacija i imenovanje

| TAKSONOMSKE KATEGORIJE | | ZAVRŠETCI | TAKSONOMSKE JEDINICE |
|------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| hrvatski | latinski | završeci | razlike |
| Nadred | <i>superordo</i> | -anae | <i>Asteranae (=Synandreae)</i> |
| Red | <i>ordo</i> | -ales | <i>Asterales</i> |
| Podred | <i>subordo</i> | -ineae | * |
| Porodica | <i>familia</i> | -aceae | <i>Asteraceae</i> |
| Potporodica | <i>subfamilia</i> | -oideae | * |
| Tribus | <i>tribus</i> | -eae | <i>Anthemideae</i> |
| Rod | <i>genus</i> | * | <i>Achillea</i> |
| Sekcija | <i>sectio, sect.</i> | * | <i>sect. Achillea</i> |
| Serija | <i>series, ser.</i> | * | * |
| (Agregat) | <i>(agregatum, agg.)</i> | * | <i>Achillea millefolium agg.</i> |
| Vrsta | <i>species, spec., sp.</i> | * | <i>Achillea millefolium L.</i> |
| Podvrsta | <i>subspecies, subsp.</i> | * | <i>subsp. sudetica (Opiz) Weiss</i> |
| Varijetet | <i>varietas, var.</i> | * | * |
| Forma | <i>forma, f.</i> | * | <i>f. rosea</i> |




Osobine

Obzirom na: (1) broj korištenih osobina, (2) način njihova tretmana i (3) načina analize sadržaja razlikuju se tri glavna pristupa sistematske botanike i posljedične klasifikacije:




Fenetski pristup

K: 41 - 45



Kladistički pristup



Proces

skup metoda namjenjenih rekonstrukciji filogenije temeljem obimnih ulaznih podataka različitih tipova; složene matematički, zahtjevne informatički; rezultati u obliku *kladograma*

PLESIOMORFIJA - sličnost u primitivnim osobinama
npr. apokarpni ginecej u por. *Ranunculaceae* i *Rosaceae*

APOMORFIJA - sličnost u odvedenim osobinama
npr. sinpetalni vjenčić u por. *Lamiaceae* i *Asteraceae*

HOMOPLAZIJA - konvergencija i paralelizam


Prefiksi:

AUTO- : odnosi se na jednu liniju ili svojtu


SIN- : odnosi se na više linija ili svojti

Angiosperm Phylogeny Website
<http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/welcome.html>


Terminologija kladograma i procesi



Odnosi skupina



Terminologija kladograma



Phylogeny and Divergence Times of Gymnosperms Inferred from Single-Copy Nuclear Genes

Ying Lu¹, Jin-Hua Ran², Dong-Mei Guo, Zu-Yu Yang, Xiao-Quan Wang^{*}
 State Key Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Abstract

Phylogenetic reconstruction is fundamental to study evolutionary biology and historical biogeography. However, there was not a more phylogeny of gymnosperms reported by extensive sampling at the genus level and no well-supported phylogenies of them were constructed based on single nucleic DNA sequences or single-copy nuclear ribosomal DNA. In this study, we used *LFY* and *NLY*, two single-copy nuclear genes that originated from an ancient gene duplication in the ancestor of seed plants, to reconstruct the phylogeny and estimate divergence times of gymnosperms based on a complete sampling of extant genera. The results indicate that the combined *LFY* and *NLY* coding sequences can resolve interfamilial relationships of gymnosperms and intergeneric relationships of most families. Moreover, the addition of intron sequences can improve the resolution in Podocarpaceae, but not in cycads, although divergence times of the cycad genera are similar to or longer than those of the Podocarpaceae. Our study strongly supports cycads as the basal-most lineage of gymnosperms, rather than sister to Ginkgoaceae, and a sister relationship between Podocarpaceae and Araucariaceae. A clade between Cupressaceae-Taxaceae and Cupressaceae, and additional intergeneric relationships of some families are well supported, and the relationships between Taxaceae and Cephalotaxaceae, and between Gnetales and Gnetales are discussed based on the nuclear gene evidence. The molecular dating analysis suggests that drastic extinctions occurred in the early evolution of gymnosperms, and extant coniferous genera in the Northern Hemisphere are older than those in the Southern Hemisphere on average. This study provides an evolutionary framework for future studies on gymnosperms.

Citation: Lu Y, Ran JH, Guo DM, Yang ZY, Wang XQ (2014) Phylogeny and Divergence Times of Gymnosperms Inferred from Single-Copy Nuclear Genes. PLoS ONE 9(9): e107679. doi:10.1371/journal.pone.0107679

Editor: Sven Buerki, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom

Received March 7, 2014; Accepted August 19, 2014; Published September 15, 2014

Copyright: © 2014 Lu et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Data Availability: The authors confirm that all data underlying the findings are fully available without restriction. All gene sequences are deposited in NCBI and the GenBank accession numbers are shown in Table S1. All LFY and NLY gene sequences determined in this study are deposited in NCBI under GenBank accession numbers KF377956-KF377991, KF377994-KF377918 and KF377921-KF377963, and the trees and alignments are deposited in TreeBase (number S16207).

Funding: This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 31170197, 31330008). The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Competing Interests: The authors have declared that no competing interests exist.

* Email: xiao_wang@ibcas.ac.cn

These authors contributed equally to this work.




Figure 2. Comparison of ML trees of gymnosperms constructed using *LFY*+*NLY* sequences. A and C, All three codon positions were used; B and D, 1st and 2nd codon positions were used. A and B, *Angiopteris lygodiifolia* was used as outgroup; C and D, The cycads were used as functional outgroups. Numbers associated with branches are bootstrap percentages of ML higher than 50% and Bayesian posterior probabilities greater than 0.90, respectively.

doi:10.1371/journal.pone.0107679.g002